

a cura di:  
AIFA - Settore HTA ed Economia del Farmaco  
AIFA - Ufficio Stampa e della Comunicazione

**PAXLOVID**  
Cosa c'è da sapere

## Cos'è PAXLOVID

- ▶ Paxlovid è un farmaco antivirale a base di due principi attivi, nirmatrelvir (PF-07321332) e ritonavir, che si è dimostrato efficace nelle forme lievi o moderate di COVID-19.
- ▶ È indicato negli adulti ( $\geq 18$  anni) con infezione documentata da SARS-CoV-2 non sottoposti a terapia con ossigeno e che sono più a rischio di sviluppare forme gravi di COVID-19 (es. malati oncologici, persone con patologie cardiovascolari, diabete mellito non compensato, broncopneumopatia cronica e obesità grave).
- ▶ Va assunto entro 5 giorni dall'insorgenza dei sintomi.

## Chi prescrive PAXLOVID

- ▶ Deve essere prescritto da un centro specialistico o dal medico di medicina generale e può essere ritirato in farmacia senza costi per il paziente.
- ▶ Può interagire con altri farmaci pertanto è necessario fare il punto con il proprio medico sulle terapie che si stanno assumendo.
- ▶ Il medico valuterà se sospendere temporaneamente le altre terapie o fornirà specifiche avvertenze al paziente.
- ▶ Il farmaco non è raccomandato in caso di grave insufficienza renale o epatica.

## Gravidanza e allattamento

- ▶ Sebbene non sia controindicato, Paxlovid non è raccomandato in gravidanza in quanto i dati disponibili sono ancora troppo pochi.
- ▶ L'allattamento materno va evitato durante il trattamento con Paxlovid e, per precauzione, per 7 giorni dopo l'interruzione della terapia.
- ▶ È sconsigliato intraprendere una gravidanza durante il trattamento con Paxlovid.
- ▶ I contraccettivi ormonali combinati potrebbero essere meno efficaci se associati a Paxlovid. È opportuno ricorrere a metodi contraccettivi alternativi o aggiuntivi.

## Come si assume

- ▶ Paxlovid (2 compresse di PF-07321332 e una di ritonavir) va assunto ogni 12 ore per 5 giorni. È importante che le tre compresse vengano assunte insieme.
- ▶ Una confezione include 5 blister (uno per ogni giorno di terapia).
- ▶ Ogni blister è schematicamente suddiviso in due segmenti con il simbolo del sole e della luna contenenti ognuna 2 compresse di PF-07321332 (compressa rosa ovale) e 1 di ritonavir (compressa a forma di capsula, bianca) da assumere, rispettivamente, al mattino e alla sera.
- ▶ Paxlovid può essere assunto con il cibo o lontano dai pasti. Le compresse devono essere deglutite intere e non devono essere masticate, spezzate o frantumate.
- ▶ In caso di patologia renale il medico indicherà al paziente il dosaggio appropriato.



## Effetti indesiderati

- ▶ Gli effetti indesiderati più comuni (che possono interessare fino a 1 persona su 10) sono alterazione del gusto, diarrea, vomito e mal di testa.
- ▶ In caso di effetto indesiderato, è bene rivolgersi al medico o al farmacista o segnalare direttamente la sospetta reazione avversa seguendo le indicazioni di AIFA: <https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>

*Per qualsiasi ulteriore informazione o approfondimento si raccomanda di consultare il proprio medico e il farmacista e di leggere il Foglio Illustrativo del farmaco e i documenti pubblicati sul portale AIFA ([www.aifa.gov.it](http://www.aifa.gov.it)).*